

Czym zwalczać chwasty w kukurydzy?

Autor: agroFakt.pl


Data: 20 kwietnia 2017

Nadszedł czas siewu kukurydzy – to dobry moment, na wybór odpowiedniego herbicydu skutecznie zwalczającego chwasty występujące w tej uprawie. Jakie środki do stosowania naliściennego warto wybrać?

Firma INNVIGO poleca w tym celu herbicydy Ricon 25 SG oraz Henik 50 SG. Ricon 25 SG to dobrze znana i sprawdzona substancja czynna – rimsulfuron w nowoczesnej formulacji, która znakomicie zwalcza jedno jak i dwuliścienne chwasty. Ricon 25 SG posiada również rejestrację do stosowania w uprawie ziemniaka. Herbicyd Rincon 25 SG stosuje się od pierwszego do siódmego liścia kukurydzy (BBCH 10-17). Maksymalna dawka środka wynosi 60 g/ha, datę zabiegu oraz dawkę należy dostosować do aktualnej sytuacji na polu.

Henik 50 SG – uzupełnia działanie Riconu

Henik 50 SG zawiera nikosulfuron, który przenika do chwastów przez liście oraz korzenie. Agrofagi zwalczane przez herbicydy Ricon 25 SG oraz Henik 50 SG to między innymi tasznik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, perz właściwy czy włośnica sina (przy maksymalnej zalecanej dawce).



Dawkowanie herbicydów Rincon i Henik w kukurydzy

Oba środki występują w formulacji SG, która zapewnia dużo lepszą rozpuszczalność w wodzie niż formulacja WG.

Herbicydy Rincon 25 SG jak i Henik 50 SG sprzedawane są z adiuwantem Asystent +, który redukuje napięcie powierzchniowe cieczy roboczej tym samym zwiększając przyczepność środków ochrony roślin do liści. Producent deklaruje, że cena herbicydów Rincon 25 SG i Henik 50 SG jest niższa, niż produktów konkurencyjnych.