

## Zwalcz choroby ziemniaka w jednym zabiegu [INFOGRAFIKA]

**Autor:** agroFakt.pl

**Data:** 1 czerwca 2018



**Wybór właściwego fungicydu w uprawie ziemniaka ma kluczowe znaczenie dla wielkości i jakości plonu. Często jednak precyzyjne rozpoznanie chorób nastęrcza plantatorom problemów. Stosując Carial® Star nie musisz zastanawiać się, co atakuje Twoje pole – alternarioza czy zaraza ziemniaka. Możesz zwalczyć obie choroby jednocześnie.**

Odpowiednio skomponowane środki ochrony roślin nie tylko chronią uprawę przed zniszczeniami, ale też są łatwe w stosowaniu. Produkt Carial® Star to wysoka skuteczność działania na dwie najgroźniejsze choroby ziemniaka, dzięki zawartości dwóch uzupełniających się substancji czynnych. Na poniższej infografice, znajdziesz informacje dotyczące odpowiedniego terminu stosowania preparatu, optymalnej dawki, a także więcej korzyści z jego użycia.

## Carial® Star

zwalcz najgroźniejsze choroby ziemniaka w jednym zabiegu!

Zaraza ziemniaka to najgroźniejszy przeciwnik w uprawie ziemniaka, wyraźnie ogranicza powierzchnię asymilacyjną liści oraz skutecznie obniża plon.

Spore zagrożenie stanowi również alternarioza, która występuje wcześniej niż zaraza, niszczy liście oraz zakaża bulwy.

**Wysoki i zdrowy plon można uzyskać tylko stosując odpowiedni produkt!**



### Objawy alternariozy ziemniaka:

- początkowy etap: niewielkie plamy na liściach podobne do tarczy strzelniczej
- następnie wokół plam pojawia się żółta otoczka



### Objawy zarazy ziemniaka:

- brązowe plamy z oliwkową obwódką na górnej stronie liści
- biały nalot grzybni dookoła plam na dolnej stronie liści
- plamy również na łodygach – forma łodygowa zarazy ziemniaka




**Carial® Star.**  
 Nowa gwiazda wśród fungicydów.

### Carial® Star:

- zwalcza zarazę oraz alternariozę w jednym zabiegu
- wysoka skuteczność działania na dwie najgroźniejsze choroby
- dzięki zawartości difenokonazolu zwalcza dwa typy alternariozy: *Alternaria alternata* oraz *Alternaria solani*
- deszcz 15 min po zabiegu nie obniża jego skuteczności
- niska dawka 0,6 l/ha oraz krótki okres karencji 3 dni

Przeznaczenie	■ Preparat do stosowania w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka
Substancje aktywne	■ 250 g/l mandipropamid ■ 250 g/l difenokonazol
Sposób działania	■ Mandipropamid - kontaktowo i węgłnie ■ Difenokonazol - systemiczne
Dawka	■ 0,6 l/ha, maksymalnie 3 razy w sezonie
Czas stosowania	■ Gdy rośliny tworzą zwarty fan (zwieranie się międzyrzędzi)
Wskazania	■ Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha ■ Opryskiwanie: drobnokroplicie



Za środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytać informacje zamieszczone na etykiecie i instrukcję. Proszę uważać, aby nie zmieszać z innymi środkami. Łożąc zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

