

Guzowata choroba skóry bydła szaleje na południu Europy!

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Data: 2 lipca 2017

Guzowata choroba skóry bydła pojawiła się również w Macedonii. W 2017 roku zaobserwowano kolejne ogniska choroby. Wirus powrócił do aktywności po chłodnym sezonie ze zdwojoną siłą. Najgorzej jest na południu Europy!

Mapa zarejestrowanych ognisk guzowatej choroby skóry bydła. Źródło; <http://www.oie.int>

Według raportu [World Animal Health Information System](#) i Banku Szczepionek przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła, dla Unii Europejskiej dostarczono 625 000 porcji szczepionek w ciągu 2016 roku. Około 50 000 sztuk szczepionek zostało przewiezionych i zużytych na terenie Macedonii. Mimo szczepień prewencyjnych wirus jest w tym kraju nadal aktywny i atakuje kolejne stada bydła. W ostatnich dniach zanotowano kolejne przypadki na terenie Rosji. Wirus przemieszcza się stale z południa na północ w głąb kraju, wzdłuż Wołgi. Obecnie największe nasilenie choroby obserwuje się w południowej części Europy.

Guzowata choroba skóry bydła

Dla przypomnienia, guzowata choroba skóry bydła jest groźnym wirusowym schorzeniem przenoszonym przez komary. Objawami charakterystycznymi są niewielkie guzki pod skórą. W szybkim tempie powoduje wyniszczenie organizmu. Jest chorobą zwalczaną z urzędu i podlega obowiązkowi rejestracji.