

Przypominamy! Groźny motyl może zagrozić sadownikom

Autor: Arleta Wojtczak

Data: 29 grudnia 2015

Motyl – owocówka południoweczka – może zagrażać polskim sadownikom.

Motyl wykryty został na przełomie sierpnia i września podczas programu kontroli upraw sadowniczych. Po raz pierwszy stwierdzono jego występowanie w pow. grójeckim i lipskim na terenie woj. mazowieckiego. W obu miejscach odłowiono, za pomocą pułapek feromonowych wystawionych w **sadach jabłoniowych**, po jednym dorosłym motyłu.

Uszkodzone przez gąsienice **pędy wędną, zamierają i zasychają**. Poniżej uszkodzonych pojawiają się boczne. Pod wpływem silnego i ciągłego zasiedlania przez szkodnika **drzewa mogą stać się krzaczaste**. Następne pokolenia gąsienic pojawiają się w okresie owocowania drzew. Drażą wewnątrz owoców korytarze, które są zwykle wypełnione odchodami owadów i delikatną przędzą. Zasiedlone owoce często dojrzewają przedwcześnie i opadają. Uszkodzenia sprzyjają też infekcji grzybów z rodzaju *Monilinia*.

Więcej informacji o tym, jak rozpoznać i zwalczać szkodnika znajduje się na stronie [PIORIN](#).