

Trzecie ognisko ptasiej grypy! Jak ochronić hodowle drobiu?

Autor: materiały firmowe

Data: 16 grudnia 2016

Ptasia grypa w Polsce się rozprzestrzenia! We wsi Białobucie (gm. Deszczno, woj. lubuskie) potwierdzono trzecie ognisko ptasiej grypy (wirusa podtypu H5N8). Tym razem chorobę wykryto w próbkach pobranych od gęsi! Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach potwierdził, że jest to ten sam wirus, co w dwóch pozostałych ogniskach, o których informowaliśmy. Ok. 1000 gęsi znajdujących się na fermie zostanie poddanych utylizacji!

W związku tym, że w Polsce odkryto już trzecie ognisko ptasiej grypy, [Krajowa Rada Drobiarstwa](#) przygotowała zalecenia dla hodowców drobiu w celu ochrony ferm przed potencjalnym wniknięciem wirusa grypy ptaków:

Jak zabezpieczyć hodowlę drobiu przed ptasią grypą?

WIRUS H5N8

1. Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem dzikich ptaków!
2. Nie wpuszczaj na fermę innych drobiarzy ani osób mających styczność z dzikim ptactwem!
3. Przestrzegaj zasad higieny!
4. Wprowadź odpowiednie zabezpieczenia wewnątrz budynków gospodarskich!
5. Przeprowadzaj regularne kontrole i kontaktuj się z powiatowym lekarzem weterynarii!



Jak zabezpieczyć hodowlę drobiu przed ptasią grypą?

1. ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Zabezpieczenie fermy (ptaków, paszy, wody) przed dostępem dzikich ptaków.

2. KONTROLE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU

Bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Zaleca się niedopuszczanie do obsługi fermy osób utrzymujących drób we własnym zakresie oraz myśliwych – osób mających kontakt z dzikim

ptactwem.

3. PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY

Zachowanie zasad higieny oraz stosowanie odzieży ochronnej, zmienianej przed każdym kolejnym budynkiem. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych i ich stałe nasączenie oraz odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

4. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Izolacja poszczególnych budynków, w których są utrzymywane ptaki, poprzez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi. Umieszczenie poidel i karmideł wewnątrz budynków (nie należy karmić i poić drobiu na zewnątrz).

5. STAŁE KONTROLE I KONTAKT Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARII

Należy regularnie prowadzić rejestr czynności oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u drobiu należy **niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii o wszelkich symptomach mogących świadczyć o wystąpieniu choroby na fermie:**

- zwiększonej śmiertelności
- oraz niespecyficznym objawom, takim jak:
 - apatia,
 - zmniejszone pobieranie paszy i wody,
 - biegunka
 - czy spadek produktywności.

Powiązane:

- [Ptasia grypa w Polsce: jedno ognisko – wiele problemów](#)
- [Ptasia grypa w Polsce: drugie ognisko – tym razem indyki!](#)