

Chowacze w natarciu! Prognozowany masowy nalot szkodników

Autor: Doradcy Procam

Data: 10 kwietnia 2018

Grupa Techniczna PROCAM uruchamia, szczególnie w środkowych, południowych, jak i zachodnich województwach kraju Czerwony Alert Szkodnikowy. Prognozuje na najbliższe dni liczne, początkowe, ale już masowe wyloty chowacza brukwiaczka oraz pojedynczych sztuk chowacza czterozębnego.



Wróblewo, rozpoczyna się nalot chowaczy, w żółtym naczyniu: 3 szt. chowacz brukwiaczek i 20 szt. chowaczy czterozębnych

fot. PROCAM

Czas na zabiegi insektycydowe

W najbliższych dniach, po przekroczeniu progu szkodliwości czas na zabiegi insektycydowe. **Preparaty, które można stosować na tego szkodnika, to insektycydy zawierające w swoim składzie *chloropiryfos*.** Substancja biologicznie czynna *chloropiryfos* atakuje system nerwowy i oddechowy owada. Ochronia rośliny do 10-14 dni po zabiegu przez

działanie żołądkowe (larwa chowacza) oraz gazowe i kontaktowe (postać dorosła chrząszcza).

Temperatura sprzyja nalotowi chowaczy i...

Jeżeli temperatura w nocy dość wyraźnie spada, należy pamiętać, że podczas południowej operacji słońca temperatura będzie dochodziła w niektóre dni do prawie 20°C i **te kilka godzin w dzień wystarczy, aby doszło do złożenia jaj w zagłębienia w dopiero co wzrastające łodygi**. Nalot chowaczy jest więc szczególnie groźnym zagrożeniem.



Rdza, septorioza oraz pierwsze infekcje mączniaka prawdziwego zbóż i traw

fot. PROCAM

Ponieważ oprócz temperatury, która warunkuje rozwój owadów, mamy jeszcze wilgoć, pamiętajmy, że w tych nadchodzących dniach będziemy jej mieli dużo, co przy temperaturach powyżej 12–15°C będzie warunkowało w rzepaku **dalsze infekcje szarą pleśnią oraz suchej zgnilizny kapustnych**, a w pszenicy mączniaka prawdziwego zbóż i traw, a także septoriozy paskowanej liści pszenicy i rdzy.

Co z bobowatymi?

Jesteśmy w okresie siewów bobowatych, gdzie zwracamy uwagę na zaprawianie ich bakteriami brodawkowatymi, **przypominamy więc o aplikacji szczepionki bakteryjnej RHIZOBIUM**. Przy okazji, prosimy zwracać uwagę w fazie wschodów bobowatych na lot muchówek, czyli szczególnie szkodliwej w tej fazie wzrostu śmietki kielkówki oraz żerowania oprzędzików.

Aktualizacja 10.04.2014 województwo pomorskie

Doradcy Agrotechniczni PROCAM dokonali dziś połowów chowaczy z rana 10.04.2018 na trasie z Gdańsk obwodnica południowa – Tczew:

Znaleziono:

- [Wróblewo](#) – 20 sztuk chowacz czterozębny / 3 sztuki chowacz brukwiaczek / 2 słodyszek rzepakowy / 1 skrzypionka zbożowa
- Grabina Zameczek – 10 sztuk chowaczy
- [Pordenowo](#) – 12 sztuk chowaczy
- [Koźliny](#) – 3 sztuki chowacz brukwiaczek (ale za to duże „tłuste” samice)
- Tczew – 5 sztuk chowacz czterozębny / 1 sztuka chowacz brukwiaczek / słodyszek rzepakowy 3 sztuki / skrzypionka zbożowa

Jak widać, większość wyłapywanych szkodników to chowacz czterozębny. Jeżeli mielibyśmy wyrokować, to środa/ czwartek na Żuławach czas będzie zaczynać zabiegi insektycydowe!

Chcesz wiedzieć więcej? Już dziś skontaktuj się Doradcami z firmy PROCAM

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

-
-
-
-
-

Submit Rating

Ocena / 5. Liczba głosów

